

第一圖 ほていたけ

(川村清一博士原圖) 略 7/10 大

○奥利根ニアル興味深キ 子囊菌 (二)

原 寬

二、ほていたけ

子實體ノ莖ハ概ネ圓柱狀デ上部ニ向ツテ細マリ時ニ下部ガ著シク太クナルコトガアル、長サ一・五—四糎、太サ二糎乃至一糎ニ達スルモノガアリ淡褐色ヲ呈シ内部ハ充實シテキル、頭部ハ頭巾狀デ半球形又ハ略球形デ黃褐色ヲ帶ビ徑五—十三糎アル、子囊ハ稍紡錘形デ $70-100 \times 6-8 \mu$ 孢子ハ短針狀デ無色 $20-30 \times 1-1.5 \mu$ ノ大サアリ中ニ小形ノ油胞ヲ含クミ後ニ隔壁ガデキル、側絲ハ細絲狀デ屢々分岐シ先端ハ種々ナ形ニ曲ツテキル、湯原附近ノ雜木林中ニ十月頃澤山生エ通例數個簇生シ形ニ變化多イモノデ往々又狀ニ分岐シテキルコトモアル

コノ菌ハ *Cudonia* ニ屬シ外形ハ「たぐやんたけ」(*Leotia gelatinosa* Hill. = *L. lubrica* Peas.) ニ似テキルガ顯微鏡的ニハ孢子ノ長イコトニヨリ、肉眼的ニハ莖ガ太ク古クナレバ其ノ基部ガ赤褐色ヲ示スコト多ク又頭部ハ古ク


カラコノ邦産ノモノモ

C. circinans Fr. ニ當テテオイテ大キナ誤ハナカロウ

○あつけしきうノ朝鮮新産地ヲ報ズ

あつけしきう (*Salicornia herbacea* L. — あかざ科) ノ産地ニ就テハ本誌第八卷、第三號ニ四國、北海道及ビ樺太ノ産地ニ就テ報告サレテキル、然ルニ朝鮮ノ産地ニ就テハ未ダ詳カニ報セラレタルモノハ無い、吾等京城藥

あつけしきうノ朝鮮新産地ヲ報ズ



第二圖 ほていたけ

1. 全形 (實大) 2. 縦断面 3. 子囊 4. 側絲
5. 孢子 (原 寛原圖)

ナツテモ又液漬標本ニシテモ決シテづきんだけノ如ク綠色ヲ帶ビナイコトニヨリ容易ニ區別サレル、安田篤氏ハ仙臺附近ニテ採集セルモノニ前記和名ヲ與ヘ歐米ニ産スル *Cudonia circinans* (Pers.) Fries. ト同種トシテ植物學雜誌第二十九卷六〇頁ニ發表シテキル、*C. circinans* Fr. ヲ外國ノ書ニ求メルト頭部ノ縁邊ガ著シク内側ヘ曲ッテヲリ孢子ノ大サヲ $35-45 \times 2 \mu$ トシテキル、Lloyd 氏ハ安田氏ノ採品ヲ檢シテコノ差異ヲ認メ *C. convoluta* Yasuda ex Lloyd, Nicot. Wright. V. p. 18 (1916) ノ新名ヲ附シタガ後安田氏ヨリノ注意ニヨリコレヲ取消シテキル、又安田氏ハ前記植物學雜誌ニ於テ孢子ノ大サヲ丁度中間ノ $30-35 \times 2 \mu$ トシテキルカラコノ範圍ノ變化ハアリウルモノト考ヘラレル、可ナリ形ガ變ル菌デア

朝鮮、京城藥學專門學校 藥學士 都 逢 涉